



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

E-learning – matematyka – poziom podstawowy

Temat: Funkcje

Materiały merytoryczne do kursu



Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia, jednak wspaniale pasuje do świata realnego i tak świetnie go tłumaczy.

(Albert Einstein)

W ramach tego kursu poznamy funkcje i ich własności: definicję funkcji oraz definicję wykresu funkcji liczbowej, a także między innymi takie pojęcia jak: dziedzina funkcji, miejsce zerowe, zbiór wartości, wartość najmniejsza i największa funkcji w danym przedziale, monotoniczność funkcji. Poznamy jak wykonać przesunięcia wykresu funkcji wzdłuż osi x oraz osi y . Omówimy także pewne szczególne funkcje jak liniowa i trygonometryczna, a także zapoznamy się z pojęciem złożenia funkcji i funkcji odwrotnej.

Zagadka

Zadanie Poissona. Podczas wycieczki jeden z jej uczestników kupił gąsior wina o pojemności 8 kwart. Kupione wino trzeba było podzielić na połowy. Jak należało dokonać tego podziału, kiedy w zajeździe były tylko dwa naczynia - jedno o pojemności 5 kwart i drugie o pojemności 3 kwart? Ile razy trzeba było przelewać wino z naczynia do naczynia?

Wino należało przelać 7 razy

W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.

(I. Kant)

1 **Pojęcie funkcji**

W matematyce oraz w życiu codziennym mamy do czynienia z różnymi przyporządkowaniami, np. każdej osobie mieszkającej na stałe w Polsce przyporządkowuje się numer PESEL, jak również każdej osobie przyporządkowuje się imię. Niektóre z tych przyporządkowań są funkcjami, a niektóre nie.

Prześledźmy pewną sytuację:
Nowi uczniowie klasy I b przychodzą do szkoły na swoją pierwszą lekcję. Na początku zajęć nauczyciel czyta listę obecności, mówiąc każdemu uczniowi, w której ławce ma usiąść. Takie przyporządkowanie będziemy nazywać funkcją. Zauważmy, że każdy z uczniów posiada swoje miejsce w ławce i każdy uczeń ma dokładnie jedno takie miejsce (nie może siedzieć jednocześnie w dwóch różnych miejscach).

***** (rysunek ucznia w ławce szkolnej) *****

Inna sytuacja:

Nauczyciel WF-u przeprowadził wśród uczniów klasy Ia sprawdzian z biegu na 100 m. Wyniki sprawdzianu zapisał w postaci zbioru par liczb, gdzie pierwszy element pary oznaczał numer ucznia z dziennika, zaś drugi element pary oznaczał czas w sekundach, uzyskany przez ucznia. Notatki nauczyciela są następujące:

$\{(2; 15), (5; 17), (10; 13), (18; 12,5), (19; 14), (21;), (26; 15,5), (28; 16,3)\}$.

Uczniowi z numerem 21 nie został przypisany czas biegu (być może uczeń nie ukończył biegu), zatem powyższe przyporządkowanie nie jest funkcją.

*******(rysunek bieżni i sportowców)*******

Spróbujmy uogólnić definicję funkcji na język matematyki:

Definicja

Funkcją f ze zbioru X w zbiór Y (przy czym zbiory X i Y są niepuste) nazywamy takie przyporządkowanie, w którym każdemu elementowi ze zbioru X został przyporządkowany tylko jeden element ze zbioru Y , co zapisujemy $f : X \rightarrow Y$.

Funkcje zazwyczaj oznaczamy literami f, g, F, G , itp.

Aby dobrze zrozumieć pojęcie funkcji rozważmy przyporządkowanie zilustrowane grafem:

*****plik1*****

Każdemu elementowi ze zbioru $X = \{A, B, C\}$ przyporządkowaliśmy tylko jeden element zbioru $Y = \{1, 2, 3\}$. W zbiorze Y został jeden element 3, który nie odpowiada żadnemu elementowi zbioru X .

Ćwiczenie:

Rozstrzygniemy, czy następujący warunek określa pewną funkcję.

a) Każdemu państwu przyporządkujemy jego stolicę (jest to funkcja).

b) Każdemu wielokątowi przyporządkujemy jego pole (jest to funkcja).

c) Każdemu czworokątowi przyporządkujemy jego oś symetrii (nie jest to funkcja, bo czworokąt może mieć więcej osi symetrii i nie mamy jednoznacznego przyporządkowania czworokątowi osi symetrii).

2 Sposoby opisywania funkcji

W przypadku, gdy X i Y są zbiorami liczb funkcję ze zbioru X w zbiór Y nazywamy funkcją liczbową, którą możemy przedstawiać na różne sposoby:

- przepisem słownym,
- tabelką,
- grafem,
- jako zbiór par uporządkowanych, gdzie poprzednik jest elementem z X , a następnik z Y ,
- wzorem,
- wykresem (graficznie).

Wykresem funkcji liczbowej $f : X \rightarrow Y$ nazywamy zbiór tych wszystkich punktów płaszczyzny o współrzędnych (x, y) , w prostokątnym układzie współrzędnych, gdzie $x \in X$, a $y \in Y$.

Przykład

Dana jest funkcja określona przepisem słownym:
”Niech $X = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{0, 1, 4, 9, 16\}$. Każdej liczbie ze zbioru X przyporządkowujemy kwadrat tej liczby”.

Przedstawimy tę funkcję na pozostałe sposoby:

- Tabelka:

*****plik 2*****

- Graf:

*****plik 3*****

- Zbiór par uporządkowanych:

$\{(-4,16),(-3,9),(-2,4),(-1,1),(0,0),(1,1),(2,4),(3,9),(4,16)\}$

- Wzór:

$y = x^2$ lub $f(x) = x^2$ lub $f : x \rightarrow x^2$,
gdzie $x \in \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$.

- Wykres

*****plik 4*****

Rozwiąż rebus:

*****plik 5*****

Hasło: **Odcięta**

3 Przekształcanie wykresu funkcji

3.1 Symetria względem osi OX

Mamy dany wykres funkcji $y = f(x)$. Utworzymy wykres funkcji $y = -f(x)$: dla kilku ob-ranych wartości x wyznaczamy $-f(x)$ i obser-wujemy figurę powstałą po połączeniu punktów $(x, -f(x))$,

czyli dla x_1 i x_2 szukamy wartości $f(x_1)$ i $f(x_2)$, następnie $-f(x_1)$ i $-f(x_2)$ oraz rysujemy wy-kres przechodzący przez punkty $(x_1, -f(x_1))$, $(x_2, -f(x_2))$:

*****plik symOX1*****

*****plik symOX2*****

Zauważamy:

Uwaga

Wykres funkcji $-f(x)$ powstaje z wykresu funk-cji $f(x)$ przez odbicie względem osi OX .

3.2 Symetria względem osi OY

Mamy dany wykres funkcji $y = f(x)$. Utworzymy wykres funkcji $y = f(-x)$: dla kilku obranych wartości x wyznaczamy $f(-x)$ i obserwujemy figurę powstałą po połączeniu punktów $(-x, f(-x))$.

*****plik symOY1*****

*****plik symOY2*****

Zauważamy, że dla obranego x otrzymujemy te same wartości $f(x)$ i $f(-x)$. Zatem:

Uwaga

Wykres funkcji $f(-x)$ powstaje z wykresu funkcji $f(x)$ przez odbicie względem osi OY .

Z symetrii względem osi OX i OY możemy zaobserwować:

Ćwiczenie

Stwórzcie wykres funkcji $y = -f(-x)$ wykorzystując informacje o symetrii względem osi OX i OY. Powstanie wykres w wyniku przekształcenia wykresu funkcji $y = f(x)$ przez symetrię względem początku układu współrzędnych.

3.3 Translacja (przesunięcie) o wektor

Mamy dany wykres funkcji $y = f(x)$.

- Narysujemy wykres funkcji $y = f(x) + b$;

Jeśli punkt (x, y) należy do wykresu funkcji $y = f(x)$, to:

*****plik tran1*****

*****plik tran2*****

Uwaga

Wykres funkcji $y = f(x) + b$ powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji $y = f(x)$ o wektor $[0, b]$ (wzdłuż osi OY).

Przykład

1. Rysujemy wykres funkcji $y = x^2$.
2. Przesuwamy każdy punkt wykresu o wektor $[0, 2]$.
3. W rezultacie otrzymujemy wykres funkcji $f(x) = x^2 + 2$.

*****plik 9*****

- Narysujemy wykres funkcji $f(x - a)$.

Omówimy teraz tworzenie wykresu funkcji $f(x - a)$.

Jeśli punkt (x, y) należy do wykresu funkcji $y = f(x)$, to

*****plik tran3*****

*****plik tran4*****

Skąd możemy wywnioskować:

Uwaga

Wykres funkcji $y = f(x - a)$ powstaje w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji $y = f(x)$ o wektor $[a, 0]$ (wzdłuż osi OX).

Przykład

1. Rysujemy wykres funkcji $y = x^2$.
2. Przesuwamy każdy punkt wykresu o wektor $[2, 0]$.
3. W rezultacie otrzymujemy wykres funkcji $f(x) = (x - 2)^2$.

*****plik 10*****

Z powyższych uwag widzimy, że:

Wniosek

Chcąc utworzyć wykres funkcji $y = f(x - a) + b$ przesuwamy punkty wykresu funkcji $f(x)$ o wektor $[a, b]$.

*****plik 8*****

4 Dziedzina funkcji liczbowej

Zbiór X nazywamy dziedziną funkcji. Dziedzinę funkcji f oznaczamy również D_f . Elementy zbioru X nazywamy argumentami funkcji.

Najczęściej będziemy zapisywać funkcję podając jej wzór, ale pamiętajmy, że funkcji nie wolno utożsamiać ze wzorem, np.

$$f(x) = 4x, D_f = \{0, 1, 3, 5\};$$

$$f(x) = 4x, D_f = C;$$

$$f(x) = 4x, D_f = [-20, \infty).$$

W przykładach tych mamy trzy różne funkcje, mimo, że w każdym przypadku wzór jest ten sam, ale dziedziny są różne. Jeżeli natomiast mamy podany tylko wzór, to jako dziedzinę przyjmujemy zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których działania we wzorze funkcji są wykonalne. Wówczas mówimy, że została określona dziedzina naturalna funkcji.

Przykład

Wyznaczyć dziedzinę funkcji $f(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2}$.
We wzorze funkcji występują dwa działania, które nie są określone w całym zbiorze liczb rzeczywistych, tzn. pierwiastkowanie i dzielenie. Pierwiastkowanie jest określone w zbiorze liczb nieujemnych, a dzielenie w zbiorze $R \setminus \{0\}$. Zatem $x + 3 \geq 0 \wedge x \in R \setminus \{0\}$,
czyli
 $x \geq -3 \wedge x \neq 0 \Leftrightarrow x \in [-3, 0) \cup (0, \infty) = D_f$.

5 Zbiór wartości funkcji

Zbiór Y nazywamy przeciwdziedziną funkcji. Przeciwdziedzinę funkcji f oznaczamy również D_f^{-1} . Zbiór tych elementów ze zbioru Y , które zostały przypisane elementom ze zbioru X , nazywamy zbiorem wartości funkcji. Zbiór wartości funkcji f oznaczamy symbolem ZW_f . Symbolicznie:

$$ZW_f = \{y : y \in D_f^{-1} \wedge \exists_{x \in D_f} y = f(x)\}.$$

Zajmiemy się teraz wyznaczaniem wartości funkcji danej wzorem.

Przykład

Wyznaczyć zbiór wartości funkcji

$$f(x) = -x^2.$$

W wyniku podnoszenia do potęgi drugiej będziemy otrzymywać liczby nieujemne. Ponieważ przed x^2 występuje znak minus, zatem wartości funkcji będą liczbami niedodatnimi, więc $ZW_f = (-\infty, 0]$.

6 Miejsce zerowe funkcji

Poniżej podana jest funkcja opisana za pomocą tabeli. "Poszukajmy" argumentu, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero

$$x \quad -3 \quad 0 \quad 1 \quad 10$$

$$F(x) \quad 3 \quad 2 \quad 5 \quad 0$$

Odczytujemy argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. Jest to miejsce zerowe funkcji. Miejszem zerowym funkcji nazywamy taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0.

Przykład

Dana jest funkcja $f(x) = 4x - 8$, gdzie $x \in \{-3, 1, 2, 5\}$. Wyznamy miejsca zerowe tej funkcji. Aby obliczyć miejsca zerowe funkcji $y = f(x)$, wystarczy rozwiązać równanie $f(x) = 0$, czyli

$$4x - 8 = 0.$$

Dodając obustronnie 8 oraz dzieląc obie strony powyższego równania przez 4 mamy:

$$x = 2.$$

Następnie sprawdzamy, czy otrzymane rozwiązanie równania należy do dziedziny funkcji. Liczba 2 jest elementem dziedziny i jest miejscem zerowym tej funkcji.

7 Pewne własności funkcji

7.1 Funkcja monotoniczna

Niech $f : A \rightarrow B$, a_1, a_2 będą dowolnymi elementami A . Wówczas funkcję f nazywa się

- rosnącą, gdy

$$a_1 < a_2 \Rightarrow f(a_1) < f(a_2),$$

- malejącą, gdy

$$a_1 < a_2 \Rightarrow f(a_2) < f(a_1).$$

Funkcją monotoniczną nazywa się każdą z powyższych rodzajów funkcji. Potocznie, funkcja jest monotoniczną, gdy wraz ze wzrostem argumentów rośnie lub maleje wartość funkcji.

Funkcję f nazywa się stałą, gdy

$$f(a_1) = f(a_2)$$

dla dowolnych $a_1, a_2 \in A$.

*****plik 12*****

Hasło: Funkcja malejąca

Przykłady

- Funkcja $f(x) = ax + b$ jest malejąca, gdy $a < 0$;
rosnąca, gdy $a > 0$;
stała, gdy $a = 0$.
- Funkcja $f(x) = a^x$ jest rosnąca, gdy $a > 1$;
malejąca, gdy $a < 1$ i stała dla $a = 1$.
- Funkcja $f(x) = x^a$ rośnie na przedziale $[0, \infty)$,
gdy $a > 0$ i maleje, gdy $a < 0$.

Ćwiczenie

Przeanalizujemy przykładowo monotoniczność funkcji $f(x) = -2x + 5$. Przyjmiemy, że $x_1 < x_2$ wtedy $-2x_1 > -2x_2$ oraz $-2x_1 + 5 > -2x_2 + 5$. Zatem $f(x_1) > f(x_2)$ czyli badana funkcja jest malejąca.

7.2 Ograniczoność z góry i z dołu

Funkcję nazywamy ograniczoną z góry, gdy wszystkie jej wartości są mniejsze od pewnej ustalonej liczby, czyli istnieje liczba M taka, że dla każdego $x \in D_f$ jest spełniony warunek $f(x) \leq M$. Podobnie funkcja jest ograniczona z dołu, gdy wszystkie jej wartości są mniejsze od pewnej ustalonej liczby, czyli istnieje liczba m taka, że dla każdego $x \in D_f$ jest spełniony warunek $f(x) \geq m$. Funkcję nazywamy ograniczoną, gdy jest jednocześnie ograniczona z góry i z dołu.

Przykłady

- Funkcje $f(x) = x$, $g(x) = x^2$ są nieograniczone. Funkcja kwadratowa $g(x) = x^2$ jest tylko ograniczona z dołu. Ogólnie, wszystkie wielomiany stopnia niezerowego i różne od wielomianu zerowego są nieograniczone.
- Ciąg $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ jest ograniczony, gdyż wszystkie jego wyrazy należą do przedziału $(0, 1]$.
- Ciąg $1, 2, 3, 4, \dots$ choć ograniczony z dołu, nie jest ograniczony z góry, zatem jest nieograniczony.
- Ciąg $-1, -3, -5, -7, \dots$ nie jest ograniczony z dołu, natomiast posiada ograniczenie górne.

7.3 Największa i najmniejsza wartość funkcji

Funkcja liczbowa przyjmuje największą (najmniejszą) wartość $y_0 \in Y$ dla $x_0 \in X$, gdy $f(x_0) = y_0$ oraz dla każdego $x \in X$ zachodzi $f(x) \leq f(x_0)$ ($f(x) \geq f(x_0)$).

Uwaga

Funkcja liczbowa, która przyjmuje największą (najmniejszą) wartość, jest ograniczona z góry (z dołu) przez tę wartość.

*****plik 15*****

Hasło: Maksimum funkcji

8 Pewne szczególne funkcje

8.1 Funkcja liniowa

Jedną z podstawowych funkcji jest funkcja liniowa.

Definicja

Funkcję określoną wzorem $f(x) = ax + b$ dla $x \in \mathbb{R}$, gdzie a i b są stałymi, nazywamy funkcją liniową. Wykresem funkcji liniowej jest prosta.

*****plik 16*****

Liczbę a nazywamy współczynnikiem kierunkowym prostej.

Definicja

Równanie postaci $y = ax + b$ nazywamy równaniem kierunkowym prostej.

Równanie $Ax + By + C = 0$, gdzie $A \neq 0$ lub $B \neq 0$ nazywamy równaniem ogólnym prostej.

Twierdzenie

Proste $y = ax + b$ ($a \neq 0$) i $y = a_1x + b_1$ są prostopadłe (równoległe) wtedy i tylko wtedy, gdy $aa_1 = -1$ ($a = a_1$).

Własności

Funkcja liniowa jest

- monotoniczna:
 - rosnąca dla $a > 0$,
 - malejąca dla $a < 0$,
 - stała dla $a = 0$.

Gdy $a = 1, b = 0$, mamy do czynienia ze szczególnym przypadkiem funkcji liniowej - mianowicie funkcją tożsamościową określoną wzorem $f(x) = x$.

8.2 Funkcje trygonometryczne trójkąta prostokątnego

*****plik Fun tryg 2*****

Tabele znaków i wartości funkcji trygonometrycznych

*****plik 23*****

Wzory podstawowe

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1,$$
$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}.$$

Ćwiczenie

Rozwiążemy równanie $ctgx \sin x + \cos x = 2$.

Dziedziną naszej funkcji jest: $D_f = \{x : x \in \mathbb{R}, x \neq k\pi, k \in \mathbb{C}\}$.

Korzystając z zależności: $ctgx = \frac{\cos x}{\sin x}$ otrzymujemy

$\cos x = 1$, skąd $x = 2k\pi, k \in \mathbb{C}$,

ale znalezione wartości nie należą do dziedziny, zatem równanie jest sprzeczne.

9 Składanie funkcji

Niech $f : X \rightarrow Y$, a $g : Y \rightarrow Z$. Niech $y = f(x)$ i $z = g(y)$, gdzie $x \in X, y \in Y, z \in Z$.

*****plik 25*****

Funkcję określoną na zbiorze X o wartościach w zbiorze Z określoną wzorem $z = g(f(x))$ nazywamy złożeniem, lub superpozycją funkcji f i g i oznaczamy je symbolem $g \circ f$.

Można powiedzieć, że superpozycja jest działaniem przyporządkowującym funkcjom f i g taką funkcję $g \circ f : X \rightarrow Z$, że $z = g(f(x))$.

Ćwiczenie

Zbuduj $f \circ g$ i $g \circ f$ dla $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $g(x) = 3x - 3$. Otrzymujemy

$$(f \circ g)(x) = f(3x - 3) = f(g(x)) = \frac{1}{3x-3+2} = \frac{1}{3x-1}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\} \text{ i}$$

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x+2}\right) = 3\frac{1}{x+2} - 3, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

10 Funkcja odwrotna

Załóżmy, że funkcja $f : X \rightarrow Y$ jest różnowartościowa i spełniony jest warunek $f(X) = Y$, czyli funkcja f odwzorowuje zbiór X na Y , wtedy możemy określić funkcję $g : Y \rightarrow X$ określoną w taki sposób, że dla dowolnego wartości $g(y)$ jest jedyny element x taki, że $f(x) = y$. Funkcja g nazywa się funkcją odwrotną do f i jest oznaczana symbolem f^{-1} .

*****plik 26*****

Jeśli funkcja f posiada funkcję odwrotną $g = f^{-1}$, to mówimy, że jest ona funkcją odwracalną. Wtedy także g jest funkcją odwracalną i $g^{-1} = f$. Złożenie funkcji wzajemnie odwrotnych jest przekształceniem tożsamościowym, czyli takim, że obrazem dowolnego elementu jest ten sam element (przekształcenie f jest tożsamością jeśli $f : X \rightarrow X$ oraz $\wedge_{x \in X} f(x) = x$), czyli $(f \circ f^{-1})(x) = x$.

Ćwiczenie

Wyznaczyć $f^{-1}(x)$ dla $f(x) = \frac{1}{x-3}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Z wzoru $y = \frac{1}{x-3}$ liczymy x i otrzymujemy:

$$y(x-3) = 1, \text{ skąd } x = \frac{1}{y} + 3.$$

Następnie zamieniamy x na y i otrzymujemy

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{x} + 3, x \neq 0.$$

Z powyższej zamiany zmiennych możemy wywnioskować:

Uwaga

Wykres funkcji odwrotnej tworzymy odbijając symetrycznie funkcję względem prostej $y = x$.

Zagadka

Niefortunna wycieczka Dwóch członków klubu kolarskiego, panowie A i B, wybrało się na wycieczkę tą samą trasą do pewnej miejscowości, odległej o 672 km. Pan B wybrał się na wycieczkę na zwykłym rowerze i jechał 40 km dziennie, pan A na motorowerze i jechał 56 km dziennie. Któregoś dnia klub wysłał jednocześnie do obu wycieczkowiczów wiadomość, wzywając ich do natychmiastowego powrotu. Obaj zastosowali się do polecenia klubu. Okazało się, że do zamierzonego celu wycieczki panu B pozostała do przebycia droga trzy razy dłuższa niż panu A. Ile dni panowie A i B jechali oraz ile kilometrów każdemu z nich pozostało do miejscowości, do której mieli dojechać? Zadanie można rozwiązać nie układając równań.

Odpowiedź:

W ciągu $10 \frac{1}{2}$ dnia pan A przejechał 588 km, a do mety pozostało mu 84 km, natomiast pan B w tym czasie przejechał 420 km, a do mety pozostało mu 252 km, czyli 3 razy więcej niż panu A.

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak. (Jean Fabre)

Zadania:

Zad.1. Rozstrzygnij czy następujący warunek określa pewną funkcję.

Każdemu morzu przyporządkowujemy rzekę, która do niego wpada.

a) jest funkcją b) nie jest funkcją

odp. b

Zad.2. Dana jest funkcja określona wzorem
 $y = -\frac{1}{2}x + 2, x \in \{-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6\}$.

- Wyznacz zbiór wartości funkcji.

a) $ZW_f = R$ b) $ZW_f = \{5, 4, 3, 2, 1, 0, -1\}$

c) $ZW_f = R \setminus \{5, 4, 3, 2, 1, 0, -1\}$

odp. b)

- Znajdź miejsca zerowe.

a) 4 b) 2 c) -2

odp. a)

- Czy funkcja jest rosnąca czy malejąca?

a) rosnąca b) malejąca c) nie monotoniczna

odp. b)

Zad.3. Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że wykres jest prostopadły do wykresy funkcji $y = 2x + 3$ i przechodzi przez punkt $A(2, 5)$.

a) $1/2x + 6$ b) $-1/2x + 6$ c) $-1/2 - 6$

odp. b)

Zad.4. Podać wzór funkcji złożonej $f(g(x))$
dla $f(x) = e^x$, $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$.
a) $e^{\frac{1}{2}x+1}$ b) $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x+1}$ c) $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}x} + 1$
odp a)

Test wyjścia:

Zad.1. Rozstrzygnij czy następujący warunek określa pewną funkcję.

1.1. Każdemu odcinkowi przyporządkowujemy jego symetralną.

a) jest funkcją b) nie jest funkcją

odp. a

1.2. Każdej liczbie naturalnej przyporządkowujemy jej dzielnik.

a) jest funkcją b) nie jest funkcją

odp. b

Zad.2. Dana jest funkcja określona wzorem
 $y = \frac{1}{x-2}$.

- Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości funkcji.

a) 2 b) \mathbb{R} c) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

odp. c)

- Znajdź miejsca zerowe.

a) brak b) \mathbb{R} c) 2

odp. a)

- Czy funkcja jest rosnąca czy malejąca?

a) rosnąca w przedziałach określoności b)
malejąca w przedziałach określoności c) nie
monotoniczna

odp. b)

Zad.3. Dana jest funkcja $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$.
Znaleźć $g(2)$.

a) 2 b) 0 c) 4

odp. b)

Czy istnieje $g(3)$.

a) tak b) nie

odp. b)

Zad.4. Dana jest funkcja $f(x) = x^2 + 2x - 3$.
3. Wyznaczyć wszystkie pierwiastki równania:
 $f(x) = f(0)$.

a) $\{-2, 2\}$ b) $\{0, 2\}$ c) $\{0, -2\}$
odp. c)

Zad.5. W tym samym układzie współrzędnych sporządzić wykresy funkcji

$$f(x) = 2x, g(x) = 2x + 2, h(x) = 2(x - 1).$$

a) ***** plik 31 *****

b) ***** plik 32 *****

c) ***** plik 33 *****

odp. a)

Zad.6. Czy wykres funkcji $f(x) = \frac{x^2+1}{2x}$ ma punkty wspólne z osiami współrzędnych?

a) tak b) nie

odp. b)

Zad.7. Napisz wzór funkcji liniowej wiedząc, że wykres jest równoległy do wykresu funkcji $y = 2x + 1$ i przechodzi przez punkt $A(1, -2)$.

a) $2x - 4$ b) $2x + 4$ c) $-2x - 4$

odp. a)

Zad.8. Dana jest funkcja liniowa $f(x) = 3x - \frac{1}{2}$ wyznacz zbiór tych argumentów, dla których wartości funkcji nieujemne.

a) $x \leq \frac{1}{6}$ b) $x \geq \frac{1}{6}$ c) $x > \frac{1}{6}$

odp. b)

Zad.9. Zbadać monotoniczność funkcji: $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$, $g(x) = \sqrt{x-1}$.

a) obie funkcje rosnące w przedziałach określoności

b) tylko jedna funkcja jest rosnąca w przedziale określoności

odp. a)

Zad.10. Wyznaczyć, o ile to możliwe, funkcje odwrotną do funkcji

$$f(x) = 4x + 6.$$

a) $\frac{1}{4}x + \frac{3}{2}$ b) $\frac{1}{4}x - \frac{3}{2}$ c) $-\frac{1}{4}x - \frac{3}{2}$

odp. b)

Zad.11. Podać wzór funkcji złożonej $f(g(x))$
dla $f(x) = 2x + 3$,
 $g(x) = \sqrt{x - 4}$.
a) $2\sqrt{x - 4} + 3$ b) $4\sqrt{x - 4} + 3$ c) $2\sqrt{x - 4} - 3$

odp a)

Zad.12. Rozwiąż równanie $\frac{1-\cos 8x}{1+\operatorname{tg} x} = 0$.
a) $k\pi \vee \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{C}$ b) $\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{C}$
odp. a)